XORNADA TÉCNICA
OS RETOS DA VITICULTURA
ANTE O CAMBIO CLIMÁTICO

5 de xuño de 2018

Centro Cultural Marcos Valcárcel
Rúa do Progreso, nº 30 - Ourense

XUNTA DE GALICIA

Diversidad de levaduras y de variedades de vid para la adaptación al cambio climático

Presentado por:

Emilia Díaz Losada y Pilar Blanco Camba

Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA-INGACAL)

<http://evega.xunta.gal/>; E-mail: pilar.blanco.camba@xunta.es

Con el apoyo de:

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Fundación Biodiversidad

20
AÑOS

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE ALIMENTOS

Proyecto financiado dentro de la convocatoria de ayudas para la adaptación al cambio climático 2016 de la Fundación Biodiversidad

OBJECTIVOS del proyecto:

- Recopilar información sobre las características de las distintas variedades de vid del banco de germoplasma de EVEGA
- Seleccionar variedades con potencial de adaptación ante las actuales condiciones de cambio climático
- Buscar especies de levaduras vínicas de interés enológico con capacidad para mitigar efectos del cambio climático en la colección de levaduras de EVEGA
- Aplicar las levaduras seleccionadas con mostos de características extremas asociadas al cambio climático para evaluar su influencia en la propiedades químicas del vino
- Establecer conclusiones y transferir los resultados al sector y a la comunidad científica

Estrategias para mitigar los efectos del cambio climático en bodega

- Prácticas prefermentativas
 - ✓ Mezcla de mostos
 - ✓ Eliminación de azúcar- nanofiltración (reducción de color y aromas)
- Estrategias microbiológicas
 - ✓ **Uso de levaduras con menor eficiencia para producir alcohol**
 - Elegir cepas de *S. cerevisiae* con baja producción de etanol
 - Otros *Saccharomyces*: *S. kudriavzevii* e híbridos de *S. cerevisiae* x *S. kudriavzevii* que producen más glicerol y menos etanol a $\downarrow T^{\text{as}}$
 - Levaduras Non- *Saccharomyces* (*Metschnikowia* spp., *Torulaspota delbrueckii*, *Starmarella bacillaris*, etc.)
 - ✓ Utilización de bacterias lácticas seleccionadas
 - *Lactobacillus plantarum* (acidificación)
- Prácticas post-fermentativas
 - ✓ Mezcla
 - ✓ Técnicas físicas para eliminación de alcohol- ósmosis inversa, pervaporación, destilación al vacío (utilidad para mitigar efectos del CC, aunque son poco aceptadas por su efecto negativo en la calidad del vino)

Recursos de la Estación de Viticultura e Enología de Galicia (EVEGA-INGACAL)

- **Colección** de distintas especies de levaduras vínicas autóctonas
- **Laboratorio de Biología** para cultivo de levaduras y caracterización molecular de microorganismos y variedades de vid
- **Laboratorio de análisis químicos** de vinos acreditado por la ENAC
- **Bodega experimental** para ensayos de microvinificaciones
- **Recursos humanos**

Colección de levaduras vínicas autóctonas

- *Saccharomyces cerevisiae* (> 60 cepas diferentes)

- *Non-Saccharomyces* (>40 especies diferentes)

- ✓ Reducir grado alcohólico
- ✓ Aumentar acidez
- ✓ Fomentar complejidad de los vinos

Diversidad de levaduras y de variedades de vid para la adaptación al cambio climático

Levaduras analizadas

Especie	Nº de cepas
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1 (XG3)
<i>Torulaspota delbrueckii</i>	4
<i>Zygosaccharomyces spp.</i>	7
<i>Hanseniaspora uvarum</i>	8
<i>Hanseniaspora vineae</i>	1
<i>Hanseniaspora clermontiae</i>	1
<i>Lachacea thermotolerans</i>	6
<i>Kluyveromyces dobzhanskii</i>	1
<i>Issatchenkia terricola</i>	2
<i>Candida californica</i>	2
<i>Candida apicola</i>	1
<i>Candida oleophila</i>	1
<i>Candida bentonensis</i>	1
<i>Candida cf. sorbosivorans</i>	1
<i>Starmerella bacillaris</i>	10
<i>Metschnikowia spp.(pulcherrima)</i>	9
<i>Metschnikowia fruticola</i>	1
<i>Pichia Kluyveri</i>	1
<i>Pichia kudriavzevii</i>	1
<i>Pichia anomala</i>	1
Total	60

Capacidad fermentativa en monocultivo

Capacidad fermentativa en monocultivo

Capacidad fermentativa en monocultivo

- Especies débilmente fermentativas:

Características vino	Especies
>150 g/L azúcar <6,5 alcohol	<i>C. bentonensis</i> ; <i>H. uvarum</i> <i>Metschnikowia spp.</i> ; <i>C. apicola</i>

- Especies con poder fermentativo medio:

Características vino	Especies
10-150 g/L azúcar 6,5-12 % alcohol	<i>H. vineae</i> ; <i>S. bacillaris</i> ; <i>L. thermotolerans</i> ; <i>Zygosacharomyces, spp.</i> ; <i>K. dobzhanskii</i> ; <i>T. delbrueckii</i> ; <i>P. anomala</i>

- Especies de alto poder fermentativo:

Características vino	Especies
<10g/L azúcar >12% alcohol	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>

Ensayos de inoculación secuencial

- Características *extremas* del mosto:

- ✓ azúcar: °Brix **26,7** (269,5 g/L)
- ✓ Grado probable: **16,3 %**
- ✓ Acidez total : 5,0 g tart/L

- Ensayo 3X 1L

- Levaduras :

13 no-*Saccharomyces*

S. cerevisiae EC1118

- Inóculo inicial:

1×10^7 cel /mL

- 2º inóculo (I2):

S. cerevisiae EC1118

- Toma de muestras:

- ✓ Fi (fase inicial)
- ✓ Ft (fase tumultuosa)
- ✓ Ff (fase final)

Diversidad de levaduras y de variedades de vid para la adaptación al cambio climático

Ensayos de inoculación secuencial: cinética fermentativa

Especie	Cepa
<i>Hanseniaspora vineae</i>	Hv129
<i>Starmerella bacillaris</i>	Sb474
<i>Metschnikowia fruticola</i>	Mf278
<i>Lachancea thermotolerans</i>	Lt93
<i>Torulaspora delbrueckii</i>	Td315
<i>Hanseniaspora uvarum</i>	Hu95
<i>Metschnikovia sp</i>	Mp176
<i>Pichia kudriavzevii</i>	Pk158
<i>Kluyveromyces dobzhanskii</i>	Kd231
<i>Zygosaccharomyces bailii</i>	Zba314
<i>Zygosaccharomyces parabailii</i>	Zp181C
<i>Candida apicola</i>	Ca31
<i>Pichia kluyveri</i>	Pkl88
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	EC1118

Diversidad de levaduras y de variedades de vid para la adaptación al cambio climático

Ensayos de inoculación secuencial: grado alcohólico

El uso de levaduras no-*Saccharomyces* mediante inoculación secuencial con *S. cerevisiae* **disminuye el grado alcohólico** de los vinos

Grado alcohólico	%(vol)
media	16,0
max	16,7 (<i>S. cerevisiae</i>)
min	14,1 (<i>T. delbrueckii</i>)
SD	0,7

Ensayos de inoculación secuencial: acidez total

El uso de levaduras no-*Saccharomyces* mediante inoculación secuencial con *S. cerevisiae* **modifica la acidez total de los vinos** de los vinos.

***L. thermotolerans* aumenta la acidez total**

Acidez Total	g tart/L
media	7,7
max	8,8 (<i>L. thermotolerans</i>)
min	6,4 (<i>H. vineae</i>)
SD	0,6

Ensayos de inoculación secuencial: glicerol

La aplicación de **levaduras no-Saccharomyces** mediante inoculación secuencial con *S. cerevisiae* **incrementa el contenido de glicerol** de los vinos.

Glicerol	g /L
media	7,9
max	11,1 (<i>S. bacillaris</i>)
min	6,3 (<i>T. delbrueckii</i> ; <i>S. cerevisiae</i>)
SD	0,6

Diversidad de levaduras y de variedades de vid para la adaptación al cambio climático

Ensayos de inoculación secuencial: valoración sensorial

Especie	Vino
<i>H. vineae</i>	Hv129	3		2	
<i>S. bacillaris</i>	Sb474	1		4	
<i>M. fruticola</i>	Mf278	5
<i>L. thermotolerans</i>	Lt93	5
<i>T. delbrueckii</i>	Td315	3	2		
<i>H. uvarum</i>	Hu95	3		2	
<i>M. pulcherrima</i>	Mp176	5
<i>P. kudriavzevii</i>	Pk158	3	2		
<i>K. dobzhanskii</i>	Kd231			5	
<i>Z. bailii</i>	Zba314	1		4	
<i>Z. parabailii</i>	Zp181C	2	2	1	
<i>C. apicola</i>	Ca31	3	1	1	
<i>P. kluyveri</i>	Pkl88	5
<i>S. cerevisiae</i>	EC1118	3	2		

Ensayos de microvinificación bodega

Levaduras no-*Saccharomyces*

1er inóculo
(Añadido al mosto)

S. bacillaris 474
L. thermotolerans 93
T. delbrueckii 315
M. fruticola 278
S. cerevisiae XG3

Sc-XG3
2º inóculo
(Densidad 1085)

- ✓ **Características del mosto:**
 - Azúcar: 231,8 g/L
 - Grado probable: 13,8
 - Acidez total: 5,1 g/L
- ✓ **Fermentaciones:** 5L (3X), 18°C
- ✓ **Inoculación secuencial**

Ensayos de microvinificación bodega: cinética fermentativa

Diversidad de levaduras y de variedades de vid para la adaptación al cambio climático

Ensayos de microvinificación bodega: implantación de las levaduras

- ✓ Los porcentajes de implantación durante de la fermentación varían entre especies.
- ✓ *T. delbrueckii* y *S. bacillaris* mantenían una frecuencia elevada hasta el final.
- ✓ *M. fruticola* predominaba en fase inicial pero era reemplazada rápidamente por *S. cerevisiae*.
- ✓ *L. thermotolerans* no se implanta sobre las levaduras del mosto

Ensayos de microvinificación bodega: influencia en el vino

	XG3	Lt93	Sb474	Td315	Mf278
Grado (%vol)	14,6±0,1 ^a	14,3±0,0 ^b	13,5±0,1 ^d	13,9±0,1 ^c	14,4±0,1 ^{ab}
Azúcares (g/L)	0,6±0,4 ^c	0,3±0,1 ^c	0,2±0,0 ^c	4,8±0,5 ^a	1,7±0,4 ^b
AT(g tart/L)	4,6±0,1 ^c	4,7±0,1 ^c	5,8±0,1 ^a	5,1±0,1 ^b	4,7±0,1 ^c
AV (g acético/L)	0,34±0,02 ^c	0,36±0,03 ^c	0,75±0,01 ^a	0,35±0,01 ^c	0,46±0,01 ^b
pH(-)	3,46±0,0 ^b	3,46±0,02 ^b	3,42±0,0 ^c	3,49±0,01 ^b	3,53±0,0 ^a
Glicerol (g/L)	6,2±0,2 ^{cd}	6,6±0,3 ^c	9,3±0,1 ^a	5,6±0,1 ^d	8,0±0,3 ^b

Grado- *S. bacillaris* y *T. delbrueckii* disminuyeron el grado de los vinos.

Acidez total- *S. bacillaris* y *T. delbrueckii* aumentaron la AT del vino.

Glicerol- *S. bacillaris* y *M. fruticola* aumentaron de forma significativa el contenido en glicerol.

Ensayos de microvinificación bodega: influencia en el vino

Los vinos elaborados con *S. cerevisiae* XG3 y *M. fruticola* presentaron un contenido mayor de acetatos, ésteres y ácidos grasos de cadena larga.

Los vinos obtenidos con *S. cerevisiae* XG3 y *T. delbrueckii* tenían mayor contenido de alcoholes superiores

Ensayos de microvinificación bodega: perfil sensorial del vino

El vino elaborado con **Sc-XG3** destacó por notas afrutadas, florales y mayor intensidad aromática y calidad global.

En vino más apreciado fue el vino elaborado con ***M. fruticola* 278**

Conclusiones y perspectivas futuras

Algunas levaduras vínicas no-*Saccharomyces* constituyen una herramienta útil para disminuir el grado alcohol de los vinos y/o aumentar su acidez.

Además, mediante inoculación secuencial permiten obtener vinos de calidad diferenciada, fomentando la diversificación de los vinos

Perspectivas futuras:

Evaluar en bodega experimental el potencial de cepas no-*Saccharomyces* autóctonas con variedades gallegas subceptibles a las nuevas condiciones climáticas.

Ofrecer al sector viticola gallego resultados concretos y recomendaciones sobre su uso con nuestras variedades de vid.

Diversidad de levaduras y de variedades de vid para la adaptación al cambio climático

Grazas pola vosa atención